

## שאלות מגזין ג'ורנאל 845

### 1. חשיפה של אימהות הרות למזהמים הנמצאים באוויר עלולה (תשובה אחת נכונה):-

- א. לגרום לאלח דם (sepsis) בתינוק
- ב. לגרום ל bronchopulmonary dysplasia ביילוד
- ג. לגרום לדלקת ריאות ביילוד
- ד. להגביר את רמת הבילירובין בדם

### 2. מה בין הפרעות פסיכיאטריות לבין הסיכון למחלות לב וכלי דם?

- א. אבחנה של הפרעה פסיכיאטרית חמורה, דוגמת הפרעה דו-קוטבית וסכיזופרניה, מלווה בעליה משמעותית בסיכון למחלות לב וכלי דם, בעיקר בקרב צעירים.
- ב. גורמי הסיכון הפרטניים אשר תרמו באופן המשמעותי ביותר לסיכון למחלות לב וכלי דם באלו עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית כללו מדד מסת גוף גבוה ועישון
- ג. הסיכון למחלות לב וכלי דם בחולים עם הפרעות פסיכיאטריות מג'וריות יורד בצורה משמעותית לאחר 30 שנה מעת האבחון
- ד. תשובות א+ב נכונות

### 3. בחולים צעירים, כיצד משפיע זעזוע מח על הסיכון להפרעות פסיכיאטריות?

- א. זעזוע מח היא תופעה חולפת ללא כל השלכות לטווח הארוך
- ב. זעזוע מוח מלווה בסיכון מוגבר להפרעות פסיכיאטריות, אשפוזים פסיכיאטריים ופגיעה עצמית בקרב צעירים בגילאי 5 עד 18 שנים
- ג. זעזוע מח עלול להחמיר בעיות נפשיות קודמות אך אין לו שום השפעה על הופעה של הפרעות חדשות
- ד. זעזוע מח מוריד את הסיכון לאשפוזים בשל הפרעות פסיכיאטריות

### 4. לפי המחקר, נשירת שיער לאחר מנופאזה-

- א. נמצא כי פחות מ-20 אחוזים מהנשים לאחר מנופאזה הציגו נשירת שיער בדפוס נשי
- ב. לגיל האישה, מרווח זמן ממנופאזה ומדד מסת גוף אין שום קשר לנשירת שיער בדפוס נשי
- ג. בלמעלה ממחצית מהנשים לאחר-מנופאזה תועדה נשירת שיער בדפוס נשי, כאשר בחלק קטן מהמקרים קיימת נשירת שיער נרחבת. אבחנה מוקדם וטיפול הולם בנשירת שיער עשויה לשפר את איכות החיים של נשים לאחר-מנופאזה.
- ד. אף אחת מהתשובות איננה נכונה

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_