

שאלות מגזין ג'ורנאל 847

1. אלו מאפיינים הדמייתיים מופיעים לעתים קרובות במקרי סרקואידוזיס?

- א. לימפאדנופתיה הילרית דו-צדדית
- ב. מדיאסטינום מורחב, וקשריות אנטרו-פוסטריות, תת-קרינאליות או הילאריות
- ג. לסרקואידוזיס אין למרבה הצער כל מאפיינים הדמייתיים
- ד. תשובות א+ב נכונות

2. הסיכון לתרומבוזיס בחולים וחולות ב-COVID-19:

- א. בגברים עם הזיהום הנגיפי תועדה מחלה חמורה יותר אך עם סיכון נמוך משמעותית לתרומבוזיס בהשוואה לנשים
- ב. בחולי COVID-19, שיעור אירועי תרומבוזיס היה גבוה יותר בגברים לעומת נשים
- ג. לאחר תקנון לערפלנים, החוקרים מצאו כי הסיכון המוגבר לתרומבוזיס בקרב גברים לעומת נשים לא נותר מובהק
- ד. בנשים עם הזיהום הנגיפי תועדה מחלה חמורה יותר עם סיכון גבוה משמעותית לתרומבוזיס בהשוואה לגברים

3. כיצד השפיעה דיאטה טבעונית על מבוגרים עם דלקת מפרקים שגרונית?

- א. החוקרים תיעדו שיפור בכאב מפרקי, ירידה ברמות כולסטרול וירידה במשקל הגוף
- ב. החוקרים תיעדו החמרה בכאב מפרקי, עליה ברמות כולסטרול ועליה במשקל הגוף
- ג. החוקרים תיעדו שיפור בכאב מפרקי עם עליה ברמות כולסטרול ובמשקל הגוף
- ד. לא תועדו כל שינויים במצבם של המבוגרים במסגרת המחקר

4. תוספי מגנזיום במבוגרים עם קדם סוכרת:

- א. מתן של תוספי מגנזיום כלוריד ($MgCl_2$) דרך הוריד אחת לשבוע במשך חודש לווה בהפחתת הסיכון לסיבוכים והוצאות טיפול רפואי בקרב מבוגרים עם קדם-סוכרת ורמות מגנזיום נמוכות בדם כבר
- ב. מתן פומי של תוספי מגנזיום כלוריד ($MgCl_2$) למשך ארבעה חודשים ומעלה לווה בהפחתת הסיכון לסיבוכים והוצאות טיפול רפואי בקרב מבוגרים עם קדם-סוכרת ורמות מגנזיום נמוכות בדם
- ג. טיפול פומי בתוספי מגנזיום כלוריד במבוגרים עם קדם-סוכרת ורמות מגנזיום נמוכות בדם הראה יעילות רק לאחר שנתיים לפחות
- ד. לטיפול פומי בתוספי מגנזיום כלוריד במבוגרים עם קדם-סוכרת ורמות מגנזיום נמוכות בדם לא היתה כל השפעה על הסיבוכים והוצאות טיפול רפואי

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____