
שאלות מגזין ג'ורנאל 859

1. מתן הנוזלים הטיפול של פנקראטיטיס חריפה צריך להיות

- א. בקצב איטי ובנפח נמוך
- ב. בקצב מהיר ובנפח נמוך
- ג. בקצב איטי ובנפח גבוה
- ד. בקצב מהיר ובנפח גבוה

2. שיעורי התמותה הכוללת ותסחיפי ריאה קטלניים לאחר ניתוח החלפת ירך וברך

- א. עולים עם הטיפול באספירין
- ב. שכיחים אך ורק בנשים בגילאי 30-40 העוברות את הניתוח
- ג. נמוכים מאד בטיפול באספירין
- ד. אין כל סיכון לתסחיפי ריאה קטלניים לאחר ניתוחים אלה

3. לפי המחקר, מה ההבדל בין אנוקספירין ואספירין להורדת אירועים טרומבואמבוליים?

- א. אנוקספירין היה יעיל יותר מאספירין
- ב. היתרון של אנוקספירין נבע בעיקר מירידה בשכיחות אירועי DVT מתחת לברך
- ג. נראתה שכיחות נמוכה באופן דומה של אירועים טרומבואמבוליים גדולים בטיפול בתרופות השונות
- ד. כל התשובות נכונות

4. לפי המחקר, ריכוז נמוך של אלבומין בדם בחולים עם אי ספיקת לב:

- א. הוא גורם סיכון בלתי תלוי לתמותה מכל סיבה לאחר 14, 28 ו-90 יום מהאשפוז
- ב. יש קשר בין עליה בריכוז אלבומין לבין עליה בסיכון לתמותה לאחר אשפוז
- ג. אין כל קשר בין ריכוז אלבומין לבין הסיכון לתמותה בחולים עם אי ספיקת לב
- ד. תסמונת מצוקה נשימתית חדה לא הראתה כל השפעה משמעותית על הקשר בין ריכוז אלבומין לבין שיעורי התמותה מכל סיבה.

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: פרופ' עמית עקירוב – עורך ראשי, פרופ' חנה מעין פרנק (מדור פדיאטרי)

מושב שואבה, 159, הרי יהודה 90855, טל. 02-5703550 – פקס. 02-5341723

דוא"ל webmaster@e-med.co.il, journal@e-med.co.il, www.e-med.co.il