

שאלות מגזין ג'ורנאל 865

1. דלקת ושטת אאוזינופילית:

- התסמין השכיח של דלקת הוושט האאוזינופילית אצל ילדים הוא דיספגיה באכילת מזון מוצק
- התרופות המאושרות כיום לטיפול הן בודסוניד budesonide effervescent ודופילומאב (dupilumab).
- דלקת הוושט האאוזינופילית היא מחלה דלקתית אקוטית
- דופילומאב מגביר את פעילות הקולטן אינטרלוקין $\alpha 4$

2. תחילת טיפול ב-ART בהקדם האפשרי לאחר אבחון HIV:

- נמצאת בעדיפות גבוהה, ואף באופן מיידי עם האבחון, כדי לשפר את הבריאות ואת תוחלת החיים של המטופלים, והתמדה בטיפול
- בעדיפות נמוכה, כדי למנוע העברת HIV לבן/בת הזוג
- לא מומלצת. ההנחיה היא להתחיל את הטיפול רק בשלושה שבועות מיום האבחון
- התחלת טיפול מוקדמת ב-ART לא משפרת הישרדות ומעורבות המטופלים, והתמדה בטיפול

3. מתן אבץ בטיפול פומי בחולי COVID-19

- בחולים מתחת לגיל 65, עם מחלות רקע או בחולים שנדרשו לחמצן, נמצא כי מתן אבץ העלה את הסיכון לתמותה
- מתן אבץ לא קיצר או האריך את משך התסמינים של הזיהום הנגיפי באף אחת מקבוצות החולים
- בחולים עם אבחנה של COVID-19, מתן אבץ פומי עשוי להפחית את שיעור האשפוזים ליחידות טיפול נמרץ ואת שיעורי התמותה לאחר 30 ימים, כמו גם לקצר את משך התסמינים של הזיהום הנגיפי
- להפתעת החוקרים, בקרב חולים מאושפזים, משך האשפוז היה קצר בקבוצת הביקורת לעומת קבוצת המטופלים באבץ

4. אנדומטריוזיס:

- השלמת בדיקת MRI בנערות מתגברות עם כאבי מחזור חמורים עשויה לקצר את מרווח הזמן עד לאבחנה של אנדומטריוזיס
- שכיחות אנדומטריוזיס נעה סביב 6-10% בקרב נשים בגיל הפוריות
- אנדומטריוזיס מלווה לעתים קרובות בכאב אגני והפרעות פוריות
- כל התשובות נכונות

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: פרופ' עמית עקירוב – עורך ראשי, פרופ' חנה מעין פרנק (מדור פדיאטרי)

מושב שואבה, 159, הרי יהודה 90855, טל. 02-5703550 פקס. 02-5341723

דוא"ל webmaster@e-med.co.il, journal@e-med.co.il, www.e-med.co.il