

שאלות מגזין ג'ורנאל 885

1. לפי המאמר, כמה מהגורמים השכיחים הבאים לקוצר נשימה עלולים לבלבל עם מחלת האסתמה:

- מיגרנות
- COPD, אי ספיקת לב, תסחיף ריאתי
- הריון בסיכון
- בחילות והקאות הנגרמות בשל טיפול אונקולוגי

2. כיצד קשורה היסטוריה רפואית של אטופיה או של אסתמה להופעת אסתמה בבגרות?

- להיסטוריה רפואית של אטופיק דרמטיטיס או נזלת אלרגית בילדות אין כל קשר לאבחנה של אסתמה
- לילדים עם היסטוריה של אסתמה בילדות יש סיכוי נמוך יותר לסבול אסתמה בבגרות
- כמחצית מהמבוגרים הסובלים ממה שנראה כאסתמה חדשה סובלים בעצם מהישנות של אסתמה מגיל הילדות
- אסתמה בבגרות מופיעה אך ורק בשל חשיפה הקשורה לעבודה, למשל עם אבק עץ, דגנים או קשקשים של בעלי חיים

3. לפי המאמר, מה הקשר בין חשיפה לזיהום אוויר לבין הסיכון לדום לב?

- החוקרים זיהו סיכון יחסי מוקטן של 62% לכל עליה של 10 מק"ג למטר מעוקב בחשיפה לחומר חלקיקי קטן מ-2.4 מיקרומטר בשבועיים שלפני אירוע דום לב
- החוקרים לא זיהו כל השפעה של חשיפה לזיהום אוויר לבין הסיכון לדום לב
- החוקרים מצאו כי חשיפה קצרת טווח לזיהום אוויר מלווה בסיכון גבוה יותר לדום לב מחוץ לכותלי בית החולים
- למרבה הפתעתם, החוקרים מצאו כי לחשיפה לחומר חלקיקי הייתה השפעה על הסיכון לדום לב מחוץ לכותלי בית החולים, רק כאשר אלו היו ברמות גבוהות בהרבה מעל לסף המוגדר כמסוכן לפי הסטנדרטים הקיימים.

4. מתן נוגדי קרישה פומיים בקשישים:

- בהשוואה למטופלים שקיבלו מינון מופחת, אלו שנטלו מינון סטנדרטי הציגו שיעור גבוה יותר של אירועי דמם, עם יחס סיכון של 1.18
- הטיפול במינון מופחת לווה בשיעור הגבוה ביותר של אירועי דמם בחולים מעל גיל 80 שנים, לעומת הקבוצה שקיבלה טיפול סטנדרטי
- בנשים עם מדד מסת גוף קטן מ-30 ק"ג/מ² שקיבלו טיפול במינון מופחת נראה שיעור גבוה פי 3 של אירועי דמם
- החוקרים זיהו קשר ישיר בין מינון הטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים ובין הסיכון לתמותה או אירועים תרומבטיים

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: פרופ' עמית עקירוב – עורך ראשי

טל. 09-7658233

דוא"ל webmaster@e-med.co.il, journal@e-med.co.il, www.e-med.co.il