

שאלות מגזין ג'ורנאל 886

1. לפי המאמר, מהי שכיחות השמנת היתר בעולם?

- שכיחות ההשמנה בעולם נמצאת בירידה מתמדת בעשור האחרון
- שכיחות ההשמנה זינקה בדרסטיות ברחבי העולם, ועלתה מ-3% ל-11% בגברים, ומ-6% ל-15% בנשים בין 1975 ל-2014
- לפי התחזיות, עד שנת 2025, כ-45% מהגברים ו-38% מהנשים ברחבי העולם יתמודדו עם השמנת יתר
- בארה"ב, כ-18% מהמבוגרים יושפעו מהשמנת יתר עד שנת 2030

2. יחס טסיות : לימפוציטים (PLR):

- בנשים עם סרטן שד, יש ליחס טסיות : לימפוציטים חשיבות פרוגנוסטית בטיפול כימותרפי ניאואדג'וונטי, כאשר יחס גבוה לווה בשיעורי תגובה והישרדות נמוכים יותר
- יחס גבוה בין טסיות : לימפוציטים בנשים עם סרטן השד נקשר לשיפור סיכוי הישרדות בנשים
- החוקרים מצאו כי על אף ממצאים קודמים, יחס PLR אינו מהווה מדד מרכזי של דלקת סיסטמית אשר נקשר עם תגובה לטיפול ניאואדג'וונטי בנשים עם סרטן שד
- החוקרים מצאו כי עולה קורלציה בין PLR נמוך ובין שיעורים נמוכים יותר של תגובה מלאה

3. לפי המחקר, אילו גורמי סיכון נקשרו עם סיכון מוגבר ל-ADHD?

- אבחנה של מחלה פסיכיאטרית אחת לא מהווה גורם סיכון לאבחון ב-ADHD
- החוקרים מצאו כי הפרעות פסיכיאטריות כמו הפרעות אכילה, הפרעה דו-קוטבית, דכאון, דחק וטראומה וחרדה היוו גורמי סיכון הקשורות לסיכון מוגבר ל-ADHD
- הסיכון הצפוי ל-ADHD במבוגרים עם הפרעות חרדה ודיכאון מטופלות עמד על 23%
- החוקרים מצאו כי טיפול בנוגדי דיכאון נקשר לירידה בסיכון לאבחון עם ADHD

4. לפי המאמר ב-JAMA, כיצד נקשר הטיפול בסטטינים והסיכון לתמותה מסרטן השד?

- טיפול בסטטינים לאחר אבחנה של סרטן שד עשוי להפחית את הסיכון לתמותה עקב המחלה הממארת, כאשר הירידה הגדולה ביותר בתמותה עקב סרטן שד הייתה בנשים שבהן רמות הכולסטרול ירדו עם הטיפול בסטטינים.
- הטיפול בסטטינים לפני אבחנה של סרטן שד נקשר לירידה בסיכון לתמותה עקב סרטן שד, גם לאחר תקנון לרמות כולסטרול
- הטיפול בסטטינים לאחר אבחנת הממאירות לווה בסיכון מוגבר לתמותה עקב סרטן שד לאחר תקנון לרמות כולסטרול כולל
- ממצאי המחקר מעידים כי להתערבויות להפחתת רמות שומנים בדם עם סטטינים אין כל השפעה על סיכויי ההישרדות של נשים עם סרטן שד

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____