

שאלות מגזין ג'ורנאל 892

1. טכיקרדיה עלייתית מוקדית:

- נובעת מהימצאותו של מוקד חשמלי פוקלי בעליה
- מהווה את הסוג השלישי הכי נפוץ – כ-17% מהמקרים, וקשורה לטריגר הנובע מפעילות גופנית או במסלול re-entry קיים
- האבחנה מסתמכת על זיהוי גלי P מונומורפיים באק"ג, שעשויים להיות שונים מקצב הסינוסים
- כל התשובות נכונות

2. לפי המחקר, מה הייתה ההשפעה של חבלת ראש על הסיכון להתפתחות סרטן המח:

- לא נקשרה לסיכון להתפתחות סרטן המח
- הממצאים הצביעו על עליה הדרגתית בהיארעות סרטן המוח עם עליה בחומרת חבלת ראש
- נראתה ירידה הדרגתית בהיארעות סרטן המח עם עליה בחומרת חבלת ראש
- במטופלים עם היסטוריה של חבלת ראש, שיעורי היארעות לכל 100 אלף שנות אדם עמדו על 15 באלו עם חבלת ראש חוזרת לעומת 1.4 באלו בלי היסטוריה של חבלת ראש

3. לפי המאמר, מה הייתה ההשפעה של התערבות ניתוחית בגידולים ממאירים על הסיכון לתרומבואמבולוזיס ורידי?

- החוקרים מצאו סיכון אבסולוטי מוגבר לתסחיף ריאה כשנה לאחר ניתוח אונקולוגי, כאשר העלייה הגדולה ביותר תועדה בחולים עם סרטן שלפוחית השתן
- הסיכון האבסולוטי המוגבר לאחר שנה אחת לפקקת ורידים עמוקה היה הגבוה ביותר בחולים עם סרטן הערמונית
- החוקרים לא מצאו כל השפעה של התערבות ניתוחית בגידולים ממאירים על הסיכון לפקקת ורידים או תסחיף ריאה
- לאחר כשלושה חודשים מהניתוח, היה הסיכון לתסחיף ריאה ופקקת ורידים לאחר ניתוח אונקולוגי גבוה פי 50 בהשוואה לחולים שלא נותחו עם כלל הממאירויות

4. הטיפול בוויטמין D בילדים ומתבגרים:

- רמות ויטמין D של 200 ננומול/ליטר הן תקינות, יש לבדוק ויטמין D בכל המטופלים אם כי לא מומלץ לטול תוספים
- אין צורך לטפל בתוספים בחסר ויטמין D באוכלוסייה זו כלל
- רמות ויטמין D של 125-75 ננומול/ליטר הינן תקינות. מומלץ לטול תוסף ויטמין D מסוג D3 עם ארוחת הערב וכן לטפל בחסר בוויטמין D (רמות נמוכות מ-50 ננומול/ליטר) בהתאם לגיל ולאנדיקציה
- הרעלת ויטמין D היא מצב שכיח מאד בילדים ועלולה להביא להיפוקלצמיה

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____