
שאלות מגזין ג'ורנאל 241 לרופאי ילדים

1. יעילות החיסון של BNT162b2 היא:

- א. 70.4% בקרב ילדים בגיל 2-4 שנים
- ב. 75.8% בקרב ילדים בגיל 6 חודשים עד לגיל שנתיים
- ג. 69.7% בקרב ילדים בגיל 6 חודשים עד גיל 4 שנים
- ד. 73.3% בקרב ילדים מגיל 6 חודשים עד גיל שנתיים

2. מנה רביעית של חיסון BNT162b2 שניתנת אחרי מנת חיסון שלישית מגבירה את ההגנה מפני זיהום חריף של קורונה כאשר היא ניתנת:

- א. 4 חודשים אחרי המנה שלישית
- ב. חודש אחד אחרי המנה שלישית
- ג. 6 חודשים אחרי המנה שלישית
- ד. חודשיים אחרי המנה שלישית

3. בלויקמיה מולדת יש לויקוציטוסיס וכן גם:

- א. ספירת טסיות תקינה
- ב. רמת המוגלובין תקינה
- ג. הפרעות ציטולוגיות בתאי בלסט
- ד. תאי דם היקפיים מסוג בלסטים

4. מנגנון הפעלת תאי CAR T כנגד תאי סרטן אינו כולל:

- א. בידוד תאי T לאחר איסופם
- ב. הנדוס תאי T במעבדה
- ג. הקולטן של תאי T נקשר לחלבון שעל גבי תאי הסרטן ומפעילים לתקיפה
- ד. הקולטן של תאי הסרטן מנטרל את הנוגדן של תאי T

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____