

---

## שאלות מגזין ג'ורנאל 244 לרופאי ילדים

---

1. אלו הם הגורמים מחוץ לאחד לאנמיה המוליטית ולהיפרבילירובינמיה לא ישירה בילוד - Indirect hyperbilirubinemia (unconjugated):

- א. פגיעה בקרום תאי הדם האדומים
- ב. עודף באנזימים מטבוליים
- ג. פגיעה במערכת החיסון של תאי הדם
- ד. פתולוגיה בצימוד של הבילירובין בכבד

2. פיקנוציטוזה אינפנטילית (Infantile pyknocytosis) מאופיינת בדברים הבאים מחוץ ל:

- א. גורמת לאנמיה המוליטית זמנית
- ב. אחראית ל%10 ממצבי אנמיה המוליטית לא מוסברת בילוד
- ג. סימני צהבת נמצאים בין 2-4 שבועות
- ד. יש הגדלת כבד וטחול

3. המלצות למושב בטיחות במהלך נסיעות של תינוקות נכונות מלבד המלצה אחת:

- א. מושב בטיחות אחורי - מומלץ לטווח גילים מלידה עד גיל שווה או פחות משנתיים
- ב. מושב בטיחות הפונה קדימה - מומלץ לטווח גילים - 5-7 שנים
- ג. חגורת בטיחות - כשהילד בגובה של 1.5 מ' ו-22.89 ס"מ.
- ד. מיטת רכב - משתמשים בה על פי שיקול דעתו של הרופא

4. דיסאוטונומיה משפחתית (ד"מ) היא מאופיינת בכל הדברים הבאים מחוץ לאחד:

- א. היא מחלה גנטית אוטוסומלית רצסיבית
- ב. היא פוגעת בעיקר באוכלוסייה של יהודים אשכנזים
- ג. הבדיקה הגנטית עדיין לא נמצאת בסל הבריאות של מדינת ישראל
- ד. היא מחלה פרוגרסיבית

ת.ז.

שם פרטי

שם משפחה

---

מערכת ג'ורנאל קלאב: עורך ראשי - פרופ' חנה מעין פרנק

מושב שואבה, 159, הרי יהודה 90855, טל. 02-5703550 פקס. 02-5341723  
זוא"ל [webmaster@e-med.co.il](mailto:webmaster@e-med.co.il), [journal@e-med.co.il](mailto:journal@e-med.co.il), [www.e-med.co.il](http://www.e-med.co.il)