

שאלות מגזין ג'ורנאל רוקחות 230

1. . שיעורי התמותה בחמש השנים הראשונות לאחר התחלת טיפולי דיאליזה:

- א. גבוהים יותר בגברים לעומת נשים
- ב. קשורים אך ורק לתמותה בשל מחלות לב וכלי דם
- ג. קיים סיכון גבוה יותר לתמותה בנשים לעומת גברים, מכל סיבה ובאופן משני בשל מחלה זיהומית ותמותה בשל הפסקה מוקדמת של טיפולי דיאליזה
- ד. החוקרים לא מצאו הבדלים מגדריים בין נשים וגברים לאחר התחלת הטיפול

2. החוקרים זיהו כי בחולים עם Primary Biliary Cholangitis יש סיכון מוגבר לשברים:

- א. רק כעשור לאחר האבחון עם PBC
- ב. החוקרים זיהו כי הסיכון מוגבר בגברים חולי PBC הסובלים מסרטן הערמונית
- ג. בילדות או נערוות לפני וסת ראשונה בלבד
- ד. שיעור שברים אוסטיאופורוטיים גבוה, ושיעורי תמותה גבוהים יותר לאחר 30 ימים ולאחר שנה אחת מהשבר, בהשוואה לקבוצת ביקורת ללא PBC

3. לפי הסקירה, בחולי צליאק:

- א. הסיכון לאבחנה של דלקת מפרקים אידיופטית של גיל הילדות גבוהה פי עשרה בילדים חולי צליאק בהשוואה לאוכלוסייה הכללית
- ב. בקרב מבוגרים עם מחלת צליאק, הסיכון לדלקת מפרקים שגרונתית (Rheumatoid Arthritis) גבוה כפליים מאשר באוכלוסייה הכללית
- ג. הסקירה מצאה כי אין קשר בין מחלת צליאק ובין JIA או דלקת מפרקים שגרונתית
- ד. בחולי צליאק צעירים יש סיכון נמוך מאשר באוכלוסייה הכללית לסבול מדלקת מפרקים אידיופטית של גיל הילדות

4. ההשפעה המגנה של חיסון נגד פנאומוקוק - PPSV23:

- א. בהשוואה לאלו שלא חוסנו כנגד החיידק, במבוגרים שחוסנו תועד סיכון נמוך ב-30% לאוטם לבבי חד
- ב. בחודש מיד לאחר החיסון הסיכון לאוטם לבבי חד היה נמוך ב-15%, אך ההשפעה המגנה לא נשמרה לאחר מכן
- ג. ההשפעה המגנה של החיסון מפני אוטם לבבי חד נותרה מובהקת סטטיסטית גם שלוש שנים לאחר החיסון
- ד. לא קיימת: נמצא כי הסיכון לאירוע מוחי עלה ב-17% בשלושת החודשים שלאחר החיסון בקבוצת הגיל שנבדקה

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: ד"ר שלמה חורי, יו"ר לשעבר של הסתדרות הרוקחים – עורך ראשי