

שאלות מגזין ג'ורנאל רוקחות 241

1. **מידת ויטמין C בחולים עם דימום חד מדרכי עיכול עליונות:**
- לפי המחקר, על אף היותו מרכיב תזונתי חיוני, חסר בוויטמין C לא נקשר לעליה בשיעורי התמותה, דימום חוזר או למשך האשפוז במטופלים הללו
 - לפי המחקר, לעודף בריכוז וויטמין C נראו השלכות שליליות על פרוגנוזה במטופלים הללו, כולל עליה בשיעורי התמותה
 - בחולים עם דימום חד מדרכי עיכול עליונות, חסר בוויטמין C מלווה בפרוגנוזה גרועה יותר, כולל עליה בשיעורי תמותה, דימום חוזר והארכת משך האשפוז
 - החוקרים ממליצים להימנע מצריכת תוספי ויטמין C בחולים עם בעיות במערכת העיכול
2. **לפי הקונצנזוס, hyperemesis gravidarum נבדל מבחילות ומהקאות בהריון:**
- אין הבדל, hyperemesis gravidarum הוא המונח הרפואי לבחילות והקאות רגילות
 - לפי קריטריונים ספציפיים: ירידה במשקל של לפחות 5%, סימני התייבשות, או ציון הריון ייחודי של הקאה ובחילה כשמדד PUQE גבוה מ-7
 - כאשר המטופלת מעידה על ירידה במשקל של לפחות 10% ועל תחושת צמא חזקה
 - לפי קריטריונים ספציפיים: ירידה במשקל של לפחות 5 ק"ג וציון גבוה מ-16 במדד PUQE
3. **לפי המחקר, מדד יחס "טריגליצרידים:גלוקוז":**
- עשוי לסייע בחיזוי הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים בחולים עם אוטם לב חד ופרופיל שומנים מאוזן לאחר התערבות כלילית מלעורית
 - בחולים עם מדד "טריגליצרידים:גלוקוז" גבוה יותר תועדו מסת גוף נמוכה יותר ושכיחות נמוכה יותר של סוכרת
 - בחולים עם מדד "טריגליצרידים:גלוקוז" גבוה יותר תועדו רמות נמוכות יותר של כולסטרול כולל, טריגליצרידים ורמות חומצה אורית
 - בחולים עם "מדד טריגליצרידים:גלוקוז" נמוך יותר תועדו שיעורי היארעות גבוהים יותר של סיבוכים קרדיווסקולאריים וצברווסקולאריים מג'וריים
4. **לפי המאמר, היסטוריה של אבחנה קודמת של כף רגל סוכרתית בחולי סוכרת סוג 2:**
- מלווה בירידה בסיכון לתמותה מכל סיבה בחולים אלו, בשל המעקב הצמוד בעניינם
 - מלווה בעליה של 50% בסיכון לתמותה מכל-סיבה בחולים אלה
 - המחקר מצא כי לאבחנה קודמת של כף רגל סוכרתית לא הייתה השפעה על הסיכון לתמותה בחולי סוכרת סוג 2
 - אף אחת מהתשובות איננה נכונה

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: פרופ' אייל שוורצברג – עורך ראשי

טל. 09-7658233

דוא"ל webmaster@e-med.co.il, journal@e-med.co.il, www.e-med.co.il